HERDEMYEŞİL DAĞ MUŞMULASI
(Cotoneaster dammeri)

15-30 cm boylanan, sürgünleri yerde sürünen herdem yeşil çalılardır. Genç sürgünleri tüylüdür. Yaprakları geniş tava biçiminde, koyu yeşil, cilalanmış gibi parlak ve çıplaktır. Alt yüzü soluk yeşil veya gri yeşil renktedir. Çiçekleri beyaz renklidir. Sıcak ve soğuk iklimlerde yetişir. Tohumla çoğaltılır. Hızlı gelişir ve yoğun hasır şeklinde etki yaratan bir yerörtücü dür. Özellikle kaya bahçelerinde eğimli alanlarda ve bahçelerde kullanılmaya uygundur.

DAĞ MUŞMULASI
(Cotoneaster franchettii)

3 m.ye kadar boylanabilen bir çalıdır. Sürgünleri tüylü, yaprakları eliptik, oval biçimli, üst yüzü tüylü, alt yüzü sarımsı, boz yâda gri beyaz renkli ve sık tüylüdür. Küçük pembe çiçekleri 5-10'lu gruplar halindedir. Portakal kırmızı meyveleri bol sayıda olup uzun süre dallarda kalır. Sarkık formludur. Her iklimde yetişebilen ve güneşli ortamlarda iyi gelişen bir çalıdır. Budanmadan çit tesisinde, kaya bahçelerinde, tek ya da grup halinde kullanılır. Tohumla, sonbahar sonunda veya ilkbaharda çelikle yâda daldırma yöntemi ile çoğaltılır.

YAYILICI DAĞ MUŞMULASI
(Cotoneaster horizontalis)

Fazla boylanmayan, 2,5-3 metre dalları ile yerde sürünerek yayılan, yaprağını döken bir çalıdır. Sürgünleri düzgün ve sık bir şekilde iki sıralı sarmal dizilmiştir. Yaprakları geniş eliptik, uçları sivrice, üst yüzü koyu yeşil ve seyrek tüylüdür. Yaprakları sonbaharda portakal sarısı veya kırmızı renge dönüşür. İlkbaharda pembe çiçek açar. Duvar önlerinde veya kaya bahçelerinde kullanılabilir. Bol güneşli yerlerde ve her iklimde çok iyi gelişir. Tohumla üretilir.

BEYAZ ÇİÇEKLİ ALIÇ
(Crataegus monogyna)

Kışın yaprağını döken 6-8 m boylanabilen bir çalıdır. Kahverengi, yeşil-kırmızı renkteki genç sürgünleri çıplak, dikenleri düz ve tek tektir. Yaprakları 3-7 loblu, üst yüzleri koyu yeşil, alt yüzleri mavi yeşil ve tüylüdür. Mayıs ayında beyaz çiçek açarlar, sonbaharda olgunlaşan kırmızı renkli meyvenin içinde tek tohum bulunur. Genellikle tohumla üretilir. Kent iklim koşullarına dayanıklı olup her türlü toprakta yetişebilir. Park ve bahçelerde tek yada grup halinde kullanıldığı gibi eğimli alanlarda, refüj-lerde rüzgar perdesi tesisinde kullanılabilir.

KIRMIZI ÇİÇEKLİ ALIÇ

(Crataegus oxyacantha)

Kışın yaprağını döken 6-8 m boylanabilen bir çalıdır. Özellikleri crataegus monogyna (beyaz çiçekli alıç) ile aynı olup çiçekleri kırmızıdır. Mayıs ayında açan çiçekleri ile dikkat çekicidir. Genellikle tohumla üretilir. Kent iklim koşullarına dayanıklı olup her türlü toprakta yetişebilir. Park ve bahçelerde tek yada grup halinde kullanıldığı gibi eğimli alanlarda, refüjlerde rüzgar perdesi tesisinde kullanılabilir.

KIRMIZI GÖVDELİ KIZILCIK

(Cornus alba)

3 m boylanabilen sık dallı, kışın yaprağını döken bir çalıdır. Genç dallarının kabuklarıkışın veya sonbaharda kırmızı renk alır. Yaprakları karşılıklı dizilmiştir ve uçları sivridir.Yapraklarının üst yüzü parlak yeşil, alt yüzü mavimsi-yeşil renklidir. Sonbaharda kırmızı yâda bakır renginde olur. Sarı-beyaz renginde ,yaz başında çiçeklenir. Park ve bahçelerde veya refüjler de grup halinde kullanılır. Kent koşullarına dayanıklıdır.

KIZILCIK
(Cornus mas)

5-8 m boylanan, kışın yaprağını döken boylu bir çalıdır. Yaprakları basit ve geniş damarlıdır. Yapraklanmadan önce açan sarı çiçekleri vardır. İlkbaharda ilk çiçeklenen bitkilerdendir. Hızlı büyür.Oval biçiminde sulu meyveleri sonbaharda parlak kırmızı renktedir. Çelikle ve tohumla üretilir.



JAPON TAFLANI
(Euonymus japonica)

Herdem yeşil, 2-3 m boylanan bir çalıdır. Sürgünlere dizili tomurcuklar uzun ve yeşildir. Yaprakları dar, yumurtamsı, deri gibi kalın, üst yüzü parlak, alt yüzü soluk yeşil renklidir. Çiçekleri yeşilimsi beyazdır ve Mayıs -Haziran aylarında açar. Güneşli ve yarı gölge alanlarda, çeşitli topraklarda yetişir. Çit bitkisi olarak yâda gruplar halinde kullanılır. Taflanların alacalı türleri de bulunmaktadır. Çelikle üretilir.

ALTIN ÇANAĞI
(Forsythia intermedia)

3 metreye kadar boylanabilen bir çalıdır. Dalları yukarı doğru açılır ve geniş tepe yapar.Hızlı ve dikine büyüme yapar .Yaprakları yumurtamsı oval biçimde, çicekleri sarı renkli çan şeklindedir. Çiçekleri yapraklanmadan önce nisan ayında açar. Baharı müjdeleyicisidir. Bol güneş alan alanlarda iyi yetişir. Çiçeklenmesi geçtikten sonra her yıl esas gövdeyi oluşturan dalların ¼ lük kısmının budanmasıyla bir sonra ki yılda bol çiçek vermesi sağlanır. 4 yıldan yaşlı ana sürgünler ise dipten itibaren 10 cm yüksekten budanmalıdır. Bordür,çit bitkisi olarak kullanıldığı gibi orta refüjlerde ,parklarda ve bahçelerde kullanılır. Çelikle üretilir.

ORMAN SARMAŞIĞI
(Hedera helix)

Her demyeşil sarılıcı ,tırmanıcı ve ye rörtücü bir bitkidir. Genç sürgünler ve çiçekleri tüylerle kaplıdır. Yapraklar dar, eliptik, sivri uçlu, 3-5 lopludur. Çiçekleri küçük ve yeşilimsi, meyvesi mavimsi siyahtır. Kökçükleri sayesinde çok iyi tırmanıcı ve sarılıcı özelliği vardır.Duvar yeşillendirilmesinde şev alanlarda,erozyon kontrolünde ve kaya bahçelerinde kullanılır.Gölge ortamlarda yetiştirilir.Yılda 2-3 kez budanır. Yarı odunlaşmış çeliklerle ve kök daldırmasıyla üretilir.

HATMİ
(Hibiscus syrıacus)

Yuvarlak tepeli, 2-3 m boylanabilen kışın yaprağını döken bir çalıdır. Genç sürgünleri tüylü, yaprakları üç loplu, alt ve üst yüzleri çıplaktır. Huni şeklinde beyaz, pembe, eflatun veya kırmızı çiçek açar. Çiçek açma zamanı temmuz-eylüldür. Güneşli ve ılıman bölgelerde yetişmesine rağmen korunmuş alanlarda kullanılabilir. Erken ilkbaharda budanır. Tohumla ve çelikle üretilir.

ÇOBAN PÜSKÜLÜ
(İlex aquifolium)

12 metre boy ,4 m taç yapabilen koyu parlak yeşil ve dikenli yaprakları ile herdem yeşil bir ağaçaççıktır. Yaprakları sert, kenarları seyrek ve keskin dikenlidir.Mayıs-Ağustosta çiçeklenir. Meyveleri kırmızı renklidir.Sık dallı ve piramidal formludur.Parlak yeşil yaprakları ve kırmızı meyveleriyle dikkat çekici bir bitkidir.Park ve Bahçelerde tek başına ya da grup halinde sınırlayıcı olarak kullanılır . Tohum ve çelikle üretilir.

KURT BAĞRI
(Ligustrum vulgare)

Ülkemizde doğal olarak yetişen, küçük yapraklı ve yaprağını döken bir çalıdır. Kısa saplı yapraklar geniş şerit, ters yumurta biçimindedir. Uçları sivri veya küt, kenarları düz, tüysüz, üst yüzü koyu, alt yüzü açık yeşildir. Üzümsü meyve, küre şeklinde ve olgunlaştığı zaman parlak siyah renklidir.Kokulu ve beyaz renkli çiçekleri Haziran ve Temmuz ayında açar.Çit bitkisi olarak kullanılır. Her türlü toprak ve ortamda yetişir. L. japonica herdem yeşil türü olup soğuğa daha hassastır. Ligustrum'lar, biri erken ilkbaharda, diğeri yaz başında olmak üzere iki kere budanmaları uygundur.Çelikle üretilir.

TATAR HANIMELİ
(Lonicera tatarica)

3,5 m boy, 3 m çap yapabilen, yaprağını döken bir çalıdır. Koyu yeşil yapraklıdır. Küçük pembe veya beyaz güzel kokulu çiçekleri, ilkbahar sonu veya yaz başında açar.Hızlı gelişler. Toprak isteği bakımından kanaatkardır.Kent iklimine karşı dayanıklıdır.Yer örtücü veya çit bitkisi olarak kullanılabilir. Budanarak şekil verilebilir. Çelik ve tohumla üretilir.

KEÇİ KULAĞI HANIMELİ
(Lonicera caprifolium)

Ülkemizin her yerinde rahatlıkla yetiştirilen bir sarılıcı türdür. Mayıs-Haziran ayında açan çiçekler, sarımsı-beyaz renklidir ve çok hoş kokuludur. Yaprakları sonbaharda mercan kırmızısı rengini alır. Yarı gölge ortamları sever, budanabilir. Çelik ve tohumla üretilir.

SARI BOYA ÇALISI
(Mahonia aquifolium)

1 m. boylanan, gösterişli bir çalıdır. Yaprakları 5-9 yaprakçıktan oluşmuş, kenarları dikenli ve dişlidir.Yapraklarının üst yüzü parlak yeşil, sert ve kalın alt yüzü de yeşilimsidir.Sonbahar da yaprakları kırmızı renge dönüşür. Nisan, mayısta sarı renkte çiçek verir. Olgun meyveleri mavimsi-siyah renkte ve gösterişlidir. Gölge ve yarı gölge alanlarda iyi gelişir. Çatı bahçeleri ,balkon ve teraslar da kap bitkisi olarak yetiştirilir. Tohum yada çelikle üretilir.

AMERİKAN SARMAŞIĞI
(Parthenocissus quinquefolia)

Hızlı büyüyen ve yaprağını döken ideal bir sarılıcıdır. Yaprakları beş parçalı kenarları dişli yaprakçıktan oluşur. İlkbaharda yeşil renkli yaprakları sonbaharda kırmızı ve turuncu renkleri ile dikkat çeker. Mavi-siyah meyveleri vardır. Ankara koşullarına en uygun, hızlı gelişen ve sıkça kullanılan sarmaşık türüdür. Güneşli ve yarı gölge ortamlarda, nemli topraklarda iyi yetişir. İlkbahar başında budanabilir. Çelikle üretilir.

SÜS NARI
(Punica granatum)

Ege ve Akdeniz bölgesinde sağlıklı gelişen ufak ağaççık, İç Anadolu bölgesinde ise korunmuş alanlarda çalı formundadır. Kışın yaprağını döker. Oval renkli, koyu yeşil olan yaprakları, sonbaharda sarı renklidir. Yaz sonu, sonbahar başında çiçek açar. Çiçekleri huni şeklinde kırmızı veya turuncu renklidir. Meyveleri önce yeşil sonra kırmızı renk alır. Grup halinde veya tek olarak rahatlıkla kullanılabilir. Tohumla üretilir.

ATEŞ DİKENİ
(Pyracantha coccinea)

3 m boylanabilen dikenli, herdem yeşil bir çalıdır. Genç sürgünleri gri tüylüdür. Yaprakları mızraksı, ters yumurtamsı, kenarları dilimli dişli, alt yüzü gençken tüylüdür. Meyveleri küre biçiminde, olgunlaşınca kırmızı, sarı veya portakal sarısına dönüşür. Parlak renkteki, gösterişli meyveleri ile park-bahçe düzenlemelerinde sıkça kullanılır. Meyveler bitki üzerinden dökülünce budanır. İlkbahar sonları veya yaz başında alınan odunlaşmış çelikle üretilir.

FRENK ÜZÜMÜ
BEKTAŞİ ÜZÜMÜ
(Ribes aureum)

2 m' ye kadar boylanabilen kışın yaprağını döken bir çalıdır. Yaprakları, yuvarlak-böbreksi biçimde, 3-5 lopludur. Yaprak ayasının üst yüzü ve alt yüzü çıplak ya da bazen hafif tüylüdür. Sarı renkli çiçekler nisan mayıs aylarında, 5-15 tanesi bir arada çiçek açar. Meyve yuvarlak, koyu kırmızı, kahverengi-mor yâda siyaha yakın olup tadı ekşidir. Sarı renkli çiçekleri dolayısıyla park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmakla beraber daha çok Frenk üzümü meyvesi ile de dikkat çekici bir bitkidir. Tohum ve çelikle üretilir.

MÜRVER
(Sambucus nigra)

5 m boylanan büyük bir çalıdır. Yaprakları tüysü, yumurta-mızrak şeklindedir. Çiçekleri krem renkli, kokulu ve haziran aylarında görülür. Meyveleri parlak siyah renklidir. Güneşli ortamları ve zengin rutubetli toprakları sever. Kirli hava şartlarına, rüzgara dayanıklıdır. Budama erken ilkbaharda yapılmalıdır. Yazın yumuşak çelikle, kışın sert çelikle, sonbaharda da tohumla üretilir.

KEÇİ SAKALI
(Spiraea vanhouttei)

2 m boylanan, yaprakları ters yumurta şeklinde, 3-5 loplu ve dişlidir. Ayanın üst yüzü koyu, alt yüzü mavi-yeşil renklidir. Mayıs- Haziran aylarında beyaz çiçek açar. Her koşula dayanıklı bir bitkidir. Çiçeklenmeden sonra budanmalıdır. Yazın çelikle üretilir.